

¿Qué es la Cervicitis Mucopurulenta?

La Cervicitis Mucopurulenta (MPC por su siglas en inglés), es inflamación de la cuello uterino (la abertura al útero o la matriz) caracterizada por una secreción amarillenta o blancuzca. Las secreciones mucopurelentas son parte mucosidad y parte inflamación de células blancas sanguínea (pus). MPC se diagnostica al notar el pus o sangrado durante un examen pélvico.

¿Cómo se contrae el MPC?

MPC puede ser causado al tener sexo anal, vaginal u oral con la persona infectada. Ahora, MPC no es siempre transmitido sexualmente. Puede que MPV sea causado por otras condiciones o problemas no relacionado con actividad sexual.

¿Cómo me puedo proteger del MPC?

Las mejores formas de protegerse contra el MPC es:

- No tener sexo.
- Limitar el número de parejas.
- Utilizar un condón látex correctamente cada vez que tenga sexo.
- Hable con su pareja sexual acerca de las infecciones transmitidas sexualmente (IST).

¿Cuáles son los síntomas de MPC?

La mayoría de las personas no sienten síntomas. El síntoma más común es un flujo vaginal, sin olor, amarillo o blanco. Si tiene alguno de estos síntomas o si ha tenido sexo con una persona con ITS, debe de comunicarse con el Departamento de Salud Pública del Condado de Guilford o su proveedor de servicios médico inmediatamente. Si se encuentra embarazada no olvide comunicárselo a su proveedor médico.

¿Es peligroso el MPC?

Si no se trata, algunas infecciones podrían causar problemas reproductivos o de otra índole.

- Los ITSs no tratados pueden extenderse al útero o las trompas de Falopio causando una enfermedad pélvica inflamatoria (PID) o si se encuentra embarazada y no el MPC no es tratado, podría perder a su bebé.
- PID podría causar daño permanente a las trompas de Falopio, el útero y los tejidos que le rodean. El daño podría causar dolor crónico pélvico, infertilidad y potencialmente un embarazo ectópico (embarazo fuera del útero).

¿Existe alguna cura para el MPC?

Usualmente antibióticos son utilizados para tratar y curar el MPC.

¿Puede usted continuar relaciones sexuales aun cuando tiene MPC?

Se recomienda no tener sexo hasta:

- Haya terminado todas las medicinas.
- Se haya tratado su pareja sexual y esta ha terminado todas las medicinas.

¿A quién llamo para recibir más información?

American Social Health Association Hotline: 1-800-227-8922 o visite la página www.ashastd.org
Guilford County Department of Public Health en Greensboro o High Point: 336-641-7777 o visite la página www.myguilford.com